



An Agricultural  
Sciences Company

# Wenn du Weitblick im Wirkstoffmanagement brauchst:

**Border<sup>®</sup>**  
**Diniro<sup>®4</sup>** **NEU**  
**Harmony<sup>®</sup> SX<sup>®</sup>**

HERBIZIDE

Unsere Herbizidlösungen für Maisflächen mit breiter Mischverunkrautung.  
Lange und breite Anwendung, flexibel mischbar, sehr gute Pflanzenverträglichkeit ...

**Successor<sup>®</sup> Top 3.0**  
**Successor<sup>®</sup> T**

**Maisherbizide  
von FMC –  
für Profis erforscht  
und entwickelt.**

## HERBIZIDLÖSUNGEN IN MAIS

	Wirkstoffe	Wirkstoffaufnahme in die Pflanze	Einsatzstadium
<b>Border<sup>®</sup></b>	Mesotrione 100 g/l	Aufnahme überwiegend über die Blätter	BBCH 12–18
<b>Diniro<sup>®4</sup></b> <b>NEU</b>	Nicosulfuron 100 g/kg Prosulfuron 40 g/kg Dicamba 400 g/kg	Blatt- und Bodenwirkung	BBCH 12–18
<b>Harmony<sup>®</sup> SX<sup>®</sup></b>	Thifensulfuron-Methyl 500 g/l	Aufnahme fast ausschließlich über die Blätter	BBCH 10–16
<b>Successor<sup>®</sup> T</b>	Terbuthylazin 187,5 g/l Pethoxamid 300 g/l	Aufnahme über Keimling und Wurzel	BBCH 10–14
<b>Successor<sup>®</sup> Top 3.0</b>	Mesotrione 100 g/l Terbuthylazin 187,5 g/l Pethoxamid 300 g/l	Effektive Kombination aus Aufnahme über die Blätter und den Keimling sowie die Wurzel	BBCH 12–14

Möchten Sie von uns regelmäßig Informationen erhalten, dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Service an:

[www.fmc4u.de](http://www.fmc4u.de)



An Agricultural  
Sciences Company

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Stader Elbstraße 26, 21683 Stade  
Telefon +49 41 41-92 04-0, [www.fmcagro.de](http://www.fmcagro.de)

**Kostenlose Hotline:  
0800 362 362 3**

Zulassungsstand: Diese Druckschrift dient der Information. Sie ersetzt nicht das Lesen der ausführlichen Gebrauchsanleitungen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.  
® Marke der FMC Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften \*® Marke einer Syngenta Konzerngesellschaft

Stand: 02/2021

# WIRKUNGSSPEKTRUM MAISHERBIZIDE FRÜHJAHR 2021

(Auswahl wichtiger Unkräuter)

	Successor® T	Border®	Successor® Top 3.0	Harmony® SX® + Trend®	Diniro® <sup>04</sup> + Adigor® <sup>04</sup>	Successor® T + Diniro® <sup>04</sup> + Adigor® <sup>04</sup>
Wirkstoffe	Pethoxamid + Terbutylazin	Mesotrione	Pethoxamid + Terbutylazin + Mesotrione	Thifensulfuron + Netzmittel	Nicosulfuron + Prosulfuron + Dicamba + Netzmittel	Pethoxamid + Terbutylazin + Nicosulfuron + Prosulfuron + Dicamba + Netzmittel
Aufwandmenge l/ha, kg/ha	4,0	1,5	3,0 + 0,75	0,015 + 0,1%	0,4 + 1,2	3,0 + 0,4 + 1,2

## Unkräuter

Acker-Kratzdistel	-	+	+	+	+++	+++
Ackerwinde (früher Einsatz bis BBCH 12/14)	-	-	-	-	+++	+++
Amarant	+++	++	+++	+++	+++	+++
Ausfallraps	++	++	+++	+++	+++	+++
Ampfer-Arten	-	+	+	+++	+++	+++
Franzosenkraut	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Gänsefuß, Weißer	+++	+++	+++	+(+)	+++	+++
Kamille-Arten	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Klettenlabkraut	++	++	+++	-	++	++
Knöterich, Ampfer-	++	+++	++	++	+++	+++
Knöterich, Floh-	++	+++	+++	++	+++	+++
Knöterich, Vogel-	++	+	++	+++	++	++
Knöterich, Winden-	++	++	+++	++	+++	+++
Nachtschatten, Schwarzer	+++	+++	+++	+	+	++
Stiefmütterchen	++	++	+++	+	++	++
Storchschnabel	+++	+	++	+(+)	+	++
Taubnessel	+++	+++	+++	-	+++	+++

## Ungräser

Ackerfuchsschwanz	-	-	-	-	+++	+++
Flughäfer	-	-	-	-	+++	+++
Hirse, Borsten-	++	-	+	-	+++	+++
Hirse, Finger-	+	++	++	-	+	+
Hirse, Hühner-	++	++	+++	-	+++	+++
Quecke	-	-	-	-	+++	+++

+++ Sehr gute Wirkung ++ Gute Wirkung + Teilwirkung - Keine Wirkung

Quelle: Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2021; Eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen plus eigene FMC Versuche.

## EINSATZEMPFEHLUNG

	BBCH 12	13	14	16	18
<b>Hühnerhirse und Unkräuter</b> Bis 3-Blattstadium	Successor® Top 3.0: Successor® T 3-4l/ha + Border® 0,75-1l/ha				
<b>Ackerfuchsschwanz und Problemunkräuter</b> Ackerwinde und Windenknöterich	Diniro® <sup>04</sup> 0,4kg/ha + Adigor® <sup>04</sup> 1,2l/ha				
<b>Die Komplettlösung</b> <b>NEU</b>	Successor® T 3l/ha + Diniro® <sup>04</sup> 0,4kg/ha + Adigor® <sup>04</sup> 1,2l/ha				
<b>Der blattaktive Geheimtipp</b>	Harmony® SX® 15g/ha + Netzmittel (z.B. Trend® 0,3l/ha) Harmony® SX® 2x 7,5g/ha + Netzmittel (z.B. Trend® 0,3l/ha)				
<b>Grasuntersaaten (Weidelgräser)</b> Zwischen der letzten Herbizidanwendung und der Grasaussaat sollten mindestens 14 Tage liegen	Vorlage Successor® T 1l/ha + Border® 0,75-1l/ha		Nachlage Harmony® SX® 15g/ha + Netzmittel (z.B. Trend® 0,3l/ha)		
<b>Hochkonzentrierte P+K+Zn-Lösung zur Blattbehandlung</b> Verbessert die Wurzelbildung	Maize Extra 2,5l/ha		Maize Extra 5l/ha		Maize Extra 2,5l/ha